



Kui tegemist on juba ägeda kurgumandlipõletikuga, siis kurku manustatavad vahendid enam ei aita, sest need ei jõua kõikjale põletikukoldeesse.

neo-angin[®]
2,4-diklorobensüülalkohol, amüülkresool, levomentool

Kas kurk on haige?

Suuõõne ja neelu antiseptiline ja valuvaigistav ravim, mis toimib suu- ja neelupõletikke tekitavate bakteritele ja seentele. Saadaval ka suhkruvabalt. Käsimüügiravim.

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Kaebuste püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Müügiloa hoidja: DIVAPHARMA GmbH, Berliin, Saksamaa. Täiendav info Eesti esindusest: H. Abbe Pharma, Pirta tee 20T, 10127, Tallinn, tel. 646 0980

Algus lk 83

Dr Aus teab, et sageli pole kurguvalud seotud külmetamisega või mandlite põletikuga, vaid tegu võib olla hoopis mõne ninahaigusega. Inimene peab ennast ise jälgima.

“Kurguvalu põhjuseks võib olla ka mao ülehappesus. Kui maohape satub söögitoru kaudu neelu, põhjustades seal limaskestas söövitust, võib tagajärjeks olla kurguvalu. Ka seda saavad inimesed ise tähele panna ja oma arstile rääkida, et kergendada haiguse diagnoosimist ning ravi määramist.”

Mis kurguvalule leevendust toob?

Kurguvalu leevendavad kõige paremini põletikuvastased preparaadid ehk peavalu ja palavikku alandavad ravimid. Sageli aitab kurguvalu korral kurgu kuristamine soolalahusega. Apteekides müüakse ka tõhusaid pihustatavaid aerosoole.

Kui tegu on juba tõsisema hädaga, siis kurku manustatavad vahendid enam ei aita, sest need ei jõua kõikjale põletikukoldeesse. Sellisel juhul tuleb pöörduda peaarsti poole, kes vaatab, mis seal kurgus on ning annab ravisoovitused või kirjutab välja ravimid.

Tõsisema häda korral tulevad appi antibiootikumid. Needki on tänapäeval erinevad. Veneaegne tetratsükliin suurt ei aita, seda pole mõtet naabrinaise soovitusel võtta. Eri bakterite allutamisele on tänapäeval kindlad antibiootikumid.

Dr Indrek Aus räägib ka keerule nimega sõnapaarist “peritonsillaarne abstsess” ehk maa-keeli mandlitagune mädanik. See on ägeda kurgumandlipõletiku tüsistus, mis kõige sagedamini tekib kolmandal-neljandal päeval pärast kurguvalu teket.

“Aga selline tüsistus võib tekkida ka juba 12–24 tunni möödudes kurguvalu algusest. Haigusele on iseloomulik just kurguvalu ühel pool kurgus ja tavaliselt esineb ka suuavamistakistus. Väga sageli on ka söömiskraskus.

Palavik võib olla kõrge, ent mõnikord väike. On olnud isegi haigeid, kellel pole üldse palavikku. Kõik sõltub sellest, kuidas kellegi organism põletikule rea-