

VALGUSIDANEJAD

Nende seemneid ei kaeta

Aedkohhiad, aed-raudürt, begooniad, harilik heliotroop, kirju toreenia, lamav sanvitaalia, lemmaltsad, liiltubakad, lobeelia, mehhiko päsmaslill, mehhiko õnnehein, mätasharjad, müür-kipslill, peruu alonsoa, petuuniad, pärdiklilled, salveid, suur lõvilõug, suureõeline keskpäevalill, suureõeline portulak, tume purpurvanik.

■ Tugeva kevadpäikese vastu tuleb noori õrnu taimi varjutada, muidu kõrbevad nad ära.

■ Jälgige, et tõusmepõletik külvi ei hävitaks. Nakatunud taime varre alumine osa muutub peeneks ja tumeneb, haiged taimed närtsivad ja lamanduvad. Kõik kahjustatud tõusmed hukuvad. Eriti kergesti haigestuvad sametlilled, lõvilõuad, suvilevkoid ja aedkohhiad.

■ Taimihakatistel hakkab õige pea külvianumas kitsas ja nad tuleb ümber istutada. Sobiv aeg pikeerida on idulehtede või esimese pärislehe faasis.

Vahendatud raamatust "Suvelilled" (Ajakirjade Kirjastus 2009).

TASUB TEADA

Külva varakult

Veebruar – märtsi algus: aednelk, ahtalehine käokuld, alatiõitsev begoonia, aed-raudürt, argentiina raudürt, feerulalehine ja madal ruse, harilik heliotroop, ilupaprika, kalevikepp, kirju toreenia, kard-hõbepael, kare tilkviljak, lamav käokuld, mehhiko õnnehein, neegri-hiidhirrs, salveid, sinilobeelia, sultan-lemmalts, tume purpurvanik, värd-kirinõges.

Märts – aprilli algus: aed-pärdiklill, hertsog-lemmalts, hiina aedaster, hiina nelk, hõbeleht, hübriidpetuunia, ilukapsas, karvane pävakübar, kõrge peiulill, leeksalvei, lehtertapp, lõhnav lillhernes, lõhnav neitsikummel, müür-kipslill, mehhiko päsmaslill, mehhiko vanikkuljus, mätashari, pronksleht, riitsinus, sigaretilill, suur lõvilõug, särav gasaania, tiivuline tunbergia, tsinnia, ämbliklill.

SOOVITAME SORTE

Uusi sorte peenrale ja anumasse



➡ Harilik kosmos (*Cosmos bipinnatus*) 'Dwarf Sonata Mixed'. Madal-kasvuline (60 cm) segu, mis sobib hästi peenraste, ääriseks ja ka lilleanumasse. Et taimed varem õitsema hakkaksid, kasvatage need ette ja külvake aprillis.




➡ Ahtalehine peiulill (*Tagetes tenuifolia*) 'Lemon Gem'. Massiliselt pisikesi sidrunkollaseid õisi ja pitsiline sidrunilõhnaline lehestik, lisaks sellele ka mõnusalt madal (vaid 25 cm) – toredamat suvelille ääriseks, pinnakatjaks ja anumasse on raske tahta! Ettekasvatamiseks külvake aprillis.



➡ Madal ruse (*Bidens humilis*) 'Golden Eye'. Tore taim rõdukasti ja amplicse, samuti peenraäriseks ja tühimike täitjaks. Õitseb rikkalikult suurte (läbimõõt 2–4 cm) kollaste õitega, tumeroheline lehestik on samuti kena. Moodustab laia puhmiku (kõrgus 30 cm). Külvake veebruaris-märtsis.



➡ Lõhnav lillhernes (*Lathyrus odoratus*) 'Beaujolais'. Suured kergelt lõhnavad õied on põnevad veinpunast värvi. Soodsates oludes võib taim kasvada paari meetri kõrguseks. Külvake juba märtsis-aprillis, et ilusaid õisi saaks varem nauatima hakata.



➡ Vereva sörmkübara (*Digitalis purpurea*) sordisegu

Sörmkübarad on küll kaheaastased taimed, kuid varakult, veebruaris-märtsis külvates ja taimi ette kasvatades õitsevad juba samal suvel. Kõrgus 80–150 cm.