



# HINNAKIRI



A/S.

PROVIISOR JULIUS LILL

ROHUKAUBASUURLAOD JA LABORATOORIUMID

TARTUS

EESTI  
RAHVUSRAAMATUKOGU  
AR

1-95-1304

## A/S. PROVIISOR JULIUS LILL

Kontor ja pealadu: Tartus, Narva tän. 20.  
Kõnetr. 166 ja 420.

Abikauplus: Rütli tän. 10. Kõnetr. 5-49.

Osakond: Tallinnas, V.-Viru 15. Kõnetr. 450-88.

---

1. **Acetosal tabl. 0,5.**

Raviks kui analgeticum, antipyreticum ja  
antirheumaticum.

Pakised:  $10 \times 0,5$  tabl. pappkeetas. Detail: —.20

20  $\times$  0,5 tabl. klaastorus. Detail: —.35

2. **Amidopyrin tabl. 0,3.**

Raviks kui antipyreticum, antineuralgicum ja  
analgeticum.

Pakised:  $10 \times 0,3$  tabl. pappkeetas. Detail: —.95

20  $\times$  0,3 tabl. klaastorus. Detail: 1.45

---

3. **Aq. bidestillatae** i/amp. 5 ccm.

Pakised : 1 × 5 ccm. Detail : . . . . —.25

10 × 5 ccm. Detail : . . . . 1.30

4. **Aq. bidestillatae** i/amp. 10 ccm.

Pakised : 1 × 10 ccm. Detail : . . . . —.30

5 × 10 ccm. Detail : . . . . 1.65

20 × 10 ccm. Detail : . . . . 5.40

5. **Aq. bidestillatae** i/amp. 25 ccm.

Pakised : 1 × 25 ccm. Detail : . . . . —.50

---

6. **Astma-sigaretid.**

Sisaldab toimeainena fol. Stramonii.

Näidustatud: astma bronchiale puhul.

Tarvitamine: astma hoo algul suitsetada  
1—2 sigaretti.

Originaalpakised: 20 sigaretti karbis. Detail: —.75

7. **Barbipyrin** (amidopyrindiaethylbarbituric.)  
tabl. 0,4.

Raviks kui analgeticum ja hypnoticum.

Pakised: 10 × 0,4 tabl. pappkesta. Detail: 1.35

20 × 0,4 tabl. klaastorus. Detail: 2.50

8. **Baumepalsam** (ungt. methylsalicylic. comp.).  
 Näidustused: Reuma akuutne ja krooniline, neuralgilised valud, kuiv pleuriit.  
 Tarvitamine: 1–2 korda päevas haigele kohale hõõruda ja katta villasega.  
 Originaalkarbis. Detail: . . . . . 1.50
9. **Borohexamin** (Hexamethylentetramin triboricum) tabl. 0,5.  
 Pakis: 20 × 0,5 tbl. klaastorus.  
 Põiedesinfitsiens — 2 kuni 8 tabl. päevas.  
 Detail: . . . . . 1.35
10. **Boromenthol.**  
 Nohusalv tuubis  $\frac{1}{1}$ . Detail: . . . . . —.35  
 sama  $\frac{1}{2}$ . Detail: . . . . . —.20

---

11. **Bromeval** (Bromisovalerylurea) tabl. 0,3.

Raviks kui sedativum ja hüpnootikum.

Pakised: 10 × 0,3 tabl. pappkestas. Detail: —.75

20 × 0,3 tabl. klaastorus. Detail: 1.35

12. **Calcinat** (calc. gluconic. granulat).

Näidustused: skrofuloos, tuberkuloos, dermatoos, anafülaksia ja igasuguse kaltsiumi teraapia puhul.

Tarvitamine: dessertlusika täis kuni 3 korda päevas.

Pakised: karp 50,0. Detail: . . . . . 1.30

karp 100,0. Detail: . . . . . 2.40

---

13. **Calcinat** (calc. gluconicum) i/ampullis  
5 × 10 ccm. 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> üleküllastatud lahus.

Näidustused: samad, mis calcinat granulat  
juures.

Tarvitamine: Muskli või veenisisesi 5—10  
ccm igal 2.—3.-l päeval.

Pakised:	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	5 × 5 ccm.	Detail:	.	2.55
	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	5 × 10 ccm.	Detail:	.	3.20
	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	10 × 5 ccm.	Detail:	.	4.80
	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	1 × 5 ccm.	Detail:	.	—.50
	10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	1 × 10 ccm.	Detail:	.	—.70

14. **Calcium theobromsal tabl. 0,5.**

Näidustused: Arterioskleroos, hüpertoonia ja  
kui üldine diureetikum.

Tarvitamine: kuni 3 korda päevas 0,5—1,0.

Pakis: 20 × 0,5 tabl. klaastorus. Detail: 1.40



- 
15. **Cinchophen** (Acid. phenylchinolincarbo- nic.)  
tabl. 0,5.  
Näidustused: tarvitatakse kui antiphlogisti- cum, antirheumaticum, antiartriticum ja anti- neuralgicum.  
Tarvitamine: üks tablett kolm korda päevas peale sööki  $1\frac{1}{2}$  klaasi veega noatsa täie söögisooda lisandiga.  
Pakis:  $20 \times 0,5$  klaastorus. Detail: . . . 1.50
16. **Citrovanille** 1,0.  
Raviks kui analgeticum, antineuralgicum.  
Pakis:  $5 \times 1,0$  ümbrikus. Detail: . . . —.40
17. **Di-Hexin.**  
(Sec. Hexamin sulfosalicylic.) tabl. 0,5.  
Näidustused: Siseantisepticum põie- ja kuse- teede haiguste, gripi jne. puhul.  
Tarvitamine: 4—6 korda päevas 1 tabl.  
Pakis:  $20 \times 0,5$  tabl. klaastorus. Detail: . 2.—

---

18. **Disalyl** (Acid. salicylosalicylicum) tabl. 0,5.

Näidustused: Äge ja krooniline liigese- ja musklireuma ning kuseteede infektsioonid.

Tarvitamine: 0,5—1,0 korraga 3—6 korda päevas.

Pakis: 20×0,5 tabl. klaastorus. Detail: 2.45

19. **Emsisool artificiale.**

Näidustused: Häälekareduse, bronhiidi ja köha puhul.

Tarvitamine: kuni 1 teelusika täis 1—6 korda päevas.

Pakis: 60 g klaaspurgis. Detail: . . . —.40

---

20. **Eukalyptus-Menthol kompvekid.**

Näidustused: Ülemiste hingamisteede põ-  
letikuliste haigustumiste ja katarri puhul.

Pakis: 40 g kotis. Detail: . . . . . —.25

21. **Galmanin.**

Higistamisvastane puuder, karp. Detail: . . . —.30

22. **Galmanin kreem.**

Higistamisvastane vähese rasvaga kreem  
tuub. Detail: . . . . . —.35

---

23. **Hexacitrol.**

(Hexamin. anhydromethylenocitric.) tabl. 0,5.

Näidustused: Põie- ja kuseteede antiseptikum.

Tarvitamine: 3—4 korda päevas 1—2 tabl.

Pakis: 20×0,5 tabl. klaastorus. Detail: . . . 1.40

24. **Hexamin** (Hexamethylentetramin) tabl. 0,5.

Näidustused: Põie- ja kuseteede desinfitsiens.

Tarvitamine: 3—4 korda päevas 1—2 tabl.

Pakis: 20×0,5 tabl. klaastorus. Detail: . . . —.90

---

25. **Hexin (Hexaminum sulfosalicylicum) tabl. 0,5:**

Näidustused: Põie antisepticum.

Tarvitamine: 0,5–1,0 3–6 korda päevas  
peale sööki.

Pakis: 20×0,5 tabl. klaastorus. Detail: 1.85

26. **Hemorroidide suppositoovid.**

Küünlad hemorroidide, pärasoole ja tupe  
limanaha põletikkude puhul.

Pakis: 12 küünalt karbis. Detail: . . . 1.75

*Bi seotud anoonis, e. hüdro-  
li seerum ega aune, proteinaate  
organismis, mispirast imbutas  
kudesid, eist. niraipudest.*

28. **Jod-Bismol.**

Erilisel menetusel valmistatud lahustuv  
Jod-Bismut.

Näidustused: Luues. /närvilises/.

Tarvitamine: 2 ccm 3-päevaste vahedega  
introgluteaalselt.

Pakised: i/amp. 10×2 ccm karbis. Detail:

*2ccm. Jod-bismol. 25 ccm klaasis. Detail:  
vastab 33,2 mg. Bi*

29. **Jod Calcium Theobromsal tabl. 0,5.**

Näidustused: Stenokardia, astma, arterio-  
skleroos, hüpertoonia.

Tarvitamine: 3 korda päevas 1—2 tabletti  
peale sööki.

Pakis: 20×0,5 klaastorus. Detail: . . . 1.70

---

30. **Jecototal.**

Kalamaksaõlist valmistatud ja aroomistatud  
kindla vitamiinisisaldusega preparaat.

1 ccm. = 15000 i. vitamiin — A-ühikut ja  
7500 D-ühikut.

Näidustused: Rahhiit, skrofuloos, tuberkuloos.

Tarvitamine: 5—10 tilka 2—3 korda päevas.

Pakis: 10 ccm pudelis. Detail: . . . . 2.25

31. **Kapsicin.**

Türgipipratinktuur kampri, lavendli- ja ros-  
mariini-õli, kaneeli- ja tindipähklitinktuuri,  
ammoniaagi ja seebilisandiga.

Näidustatud kui antirheumaticum.

Tarvitamine: Sisse hõõruda ja katta villasega.

Pakis: pudelis 30 g. Detail: . . . . —.70

---

32. **Kihisev broomsool.**

Sisaldab Kal. ja Natr. bromat., Ammon. bromat., Natr. bicarbonic., Acid. citric., Acid. tartaric., Sacch. alb.

Näidustatud kui sedativum ja hypnoticum.

Tarvitamine: 1 teelusikatäis kuni 3 korda päevas  $\frac{1}{2}$  kl. veega.

Pakis: klaaspurk 100,0. Detail: . . . . . 1.05

33. **Klimaktodin tbl. 0,5.**

Sisaldab: Ovaria siccata, Thyreoid. sicc., Bromevali, Calc. theobromsali.

Näidustused: Klimakteerilised vaevused.

Tarvitamine: 3 korda päevas 1 tablett.

Pakis: 20×0,5 tabl. klaastorus. Detail: 1.60



---

34. **Konnasilma vedelik.**

Konnasilmade raviks.

Pakis: klaas pintsliga 5,0. Detail: . . . —.25

35. **Konnasilma plaaster.**

Konnasilmade raviks.

Pakis: 6 tk. karbis. Detail: . . . . . —.35

36. **Linnase ekstrakt.**

Nukleoproteiide, fosforhappesoolasid ja maltoosi sisaldav vitamiinirikas toidulisand lastele, nõrkadele ja paranevaile haigeile.

Näidustused: nõrkus, rahhiit, tuberkuloos, krooniline bronhiit, eksudatiivne diatees, seedimishäired.

Tarvitamine: Lastele antakse sooja toiduga segatult 3 korda päevas 1 teelusikatäis.

Täiskasvanuile 3—4 korda päevas 1 supilusikatäis peale sööki.

Pakis: klaaspurk 200,0. Detail: . . . . . 1.50

---

37. **Linnasekompvekid.**

Näidustatud ülemiste hingamisteede katarri puhul.

Pakis : pärgamentpaberkotis. Detail: . . . —.25

38. **Magnesium peroxydatum** tabl. 0,5.

Näidustused : käärimisdüspepsia, hüperatsiditeet, meteorism, krooniline kõhukinnisus.

Tarvitamine : 1—3 korda päevas 1—2 tabletti veega peale sööki.

Pakis : 20×0,5 tabl. klaastorus. Detail: 0.90

39. **Melupyron** (Natr. phenyldimethylpyrazolon-  
amidomethansulfonic.) tabl. 0,5.  
Näidustatud kui antineuralgicum, antirheu-  
maticum, antipyreticum.  
Tarvitamine: 3 korda päevas 1—2 tabletti.  
Pakis: 10×0,5 pappkesta. Detail: . . . 1.05
40. **Metroform** (Liquor formaldehydi saponatus).  
Näidustused: käte, arstiriiistade, ruumide ja  
pesu desinfitseerimiseks, vagina loputuseks,  
pesemiseks liigse higistamise puhul.  
Tarvitamine: Metroformi tarvitatakse 1—2%  
lahusena, milleks võetakse 1—2 supilusika  
täit 1 liitri veele.  
Pakised: pudel 100,0. Detail: . . . —.60  
pudel 250,0. Detail: . . . 1.60

---

41. **Männiokka ekstrakt.**

Näidustatud vannideks reuma, podagra, iäsiase jne. puhul.

Pakis : pudel 500,0. Detail : . . . . . —.85

42. **Nasalgan salv.**

Koostis : Dijodthymoli, Procaini hydrochlorici, Ephedrini hydrochl., Mentholi, Eucalyptoli, Paraffini liq., Lanolini.

Näidustatud nohuraviks.

Pakis : tuub 9,0. Detail : . . . . . —.85

43. **Opodeldok.**

Kamprit sisaldav salv, tarvitatakse põrutatud ja paistetanud kehaosade määrimiseks. Katta villasega.

Pakised : klaaspurk 30,0. Detail : . . . . . —.40

klaaspurk 50,0. Detail : . . . . . —.60

---

44. **Painexpeller.**

Türgipipratinktuur kampri, kaneeli- ja tindipähklitinktuuri, rosmariini- ja lavendliõli, seebi ning ammoniaagi lisandiga.

Tarvitatakse sissehõõrumiseks antirheumaticumina.

Pakis : pudel 30,0. Detail : . . . . . —.75

45. **Rauafinktuur.**

Näidustatud : Roboransina.

Tarvitamine : 3 korda päevas 1 tee- kuni supilusika täis.

Pakis : pudel 250,0. Detail : . . . . . —.65

46. **Reumaliniment.**

Tarvitatakse antirheumaticumina lihaste ja liigeste reuma puhul.

Pakis : pudel 100,0. Detail : . . . . . —.65

---

47. **Rhodan Calcium Theobromsal tabl. 0,5.**

Näidustused : Hüpertoonia, apopleksia, angiospasm, stenokardia.

Tarvitamine : esimesel ravinädalal 3 tabl päevas.

2—3 ravinädalal 2 tabletti päevas ja  
4—6 ravinädalal 1 tablett päevas veega peale sööki.

Pa kis : 20 × 0,5 tabl. klaastorus. Detail: 1.60

48. **Rectosan.**

Koostis : Extr. Hamamelid, Acid, boric., Liq. Alsoli, Kal. oxychinolinsulfonic., Formalini, Balsam. Peruvian., Aethocaini hydrochloric., Ungt. Glycerini.

Näidustused : Hemorroidid, Fissura et pruritus ani.

Tarvitamine : 1 kord päevas 2—3 g erimenetlusel.

Pakis : originaaltuub karbis. Detail: . . 2.—

#### 49. Söehappevannid.

Näidustused : Reuma, Neuralgia.

Tarvitamine : Sooda lahustatakse vannivees, mille järele tabletid asetatakse vanni põhjale.

Pakis : karp. Detail: . . . . . 1.65

#### 50. Thyreotofal.

Kilpnäärme kuivsubstants. T. mite :

1 tabl. = 0,25 hiireühikut ;

T. med : 1 tabl. = 0,75 hiireühikut.

Näidustused : Myxodema, struma, adipositas, kretinismus etc.

Tarvitamine arsti erieeskirja järele.

Pakised :

50×0,3 dragees 1 tabl. = 0,75 i M.s ü. Detail : 3.—

50×0,1 dragees 1 tabl. = 0,25 i M.s.ü. Detail : 2.—

---

51. **Tonocard.**

Koostis: Püridiin- $\beta$ -karbonhappe dietüülamiidi 0,25, Corrigent. q. s. Aq. bidestill. ad 10,0

Näidustused: Pneumonia, südamerikked, kollaps. Analeptikum vereringe ja hingamishäirete puhul.

Tarvitamine: Tarbe korral kuni 1 ccm veega.

Pakised: pudel 10 ccm. Detail: . . . . . 2.55

i/amp.  $3 \times 1,2$  ccm, musklisisesi, veenisisesi ja nahaalusi. Detail: . . . . . 1.60

i/amp  $10 \times 1,2$  ccm. Detail: . . . . . 4.50

52. **Tussin.** Extr. Thymi compos. saccharat.

Näidustatud kui expectorans pertussise, bronhiidi, farüingiidi ja larüingiidi puhul.

Tarvitamine: 1 teelusika kuni 1 spl. täis 3—6 korda päevas. Detail: . . . . . —.80



53. **Uresan** (Piperazinum citrosalicylicum) tabl. 0,3.

Näidustused: Podagra, tsüstiit, reuma.

Tarvitamine: 3 korda päevas 1 tabl peale sööki.

Pakis: 20×0,3 tabl. klaastorus. Detail: 2.45

53. **Uresan** sal effervescens granulat.

Koostis: Piperazin. citrosalicylic., Lith. benzoic., Hexamini, Natr. citric., Natr. phosphoric., Sacch. alb., Ac. tartaric., Natr. bicarb.

Näidustused: Podagra, reuma, išias, tsüstiit, arterioskleroos.

Tarvitamine: kuni 3 korda päevas 1 teelusikatäis klaasi veega.  $\frac{1}{2}$  tundi enne või 3 tundi pärast sööki.

Pakis: Klaasipurk 100,0. Detail: 3.—

Uresan: kusiheppe ja tema soolade lahustaja.  
Lith. benz.: mõjub kusiheppet ja fosfaatide lahustajana.  
Hexamini: annab formaldehüüd. mi mõjub antiseptiliselt. 23  
Natr. citrici ja phosphor. - paremat seedmist.

---

**Steriilitud lahused ampullides alati  
laos valmis.**

**Coffein. natr. benzoic.** 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1—2 ccm.  
20<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1, 2 ja 10 ccm.

**Ergofin** 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 1 ccm.

**Natr. kakodylic.** 5 ja 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> à 1 ccm.

**Morfium hydrochloric.** 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1,2×10 ccm.

„ „ 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1,2×10 ccm.

„ „ 1,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1 ccm.

„ „ 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1 ccm.

„ „ 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 10 ccm.

„ „ 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 5 ccm.

**Ol. camphorat, c. ol. amygdal. dulc.**  
**paraf.** 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1×2 ccm.

20<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 1,2×5 ccm.

**Ol. camphorat, c. ol. amygdal. dulc.**  
**paraf.** 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, 1,2×5 ccm.

20<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 1,2×5 ccm.

**Peale loetelu valmistatakse tellimiste  
peale kiirelt ampulle ja tablette iga-  
suguseis koostisis ja vahekorris.**

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU



AR1-95-01304

O./ü. „Ilutrükk“. Tartu, 1937.