

# Külvamise ja tärkamise aja mured

REPRO

**Kui kevade ootamisest kärsitu aednik on teinud aknalauale taimede ettekasvatamiseks esimesed külvid, algab kohe ka mure nende käekäigu pärast. Näiteks võib tõusmepõletik korraldada külvikastis massimõrva.**

1. Külvake üksnes puhtasse mulda. Keldrist, kuurist ja ka poest toodud külviturvas/muld nuusutage üle: kui tunnete seenelõhna, siis sellist kasvusubstraati ärge kasutage. Üldjuhul sinna tehtud külvidest asja ei saa.

2. Substraadi pinnale tekkinud tihe niidistiku sarnane kirmee ei lase korralikult läbi vett ja õhku. Seenekirmee kõrvaldamiseks kobestage turvas/muld korralikult läbi ja töödelge mõne seenhaiguste tõrje preparaadi ehk fungitsiidiga (nt Previcur).

3. Ärge kasutage külvamiseks ühte mulda mitu korda järjest. Eriti siis, kui esimene külv mingil põhjusel hukkus, ei maksa samasse mulda korduskülvi enam teha.

4. Aiast toodud muld kuumutage ahjus või aurutage potis läbi paar päeva enne külvamist. See hävitab seenesed, vaglad, sitikad jm, mis võiks külvi rikkuda.

5. Suurim häda, mis tärkavaid taimi kipub tabama, on tõusmepõletik. Haiguse tunnuseks on juurekaela või varre alumise osa tumenemine ja nõõrdumine, suure õhuniiskuse korral muutub piirkond limaseks. Kudede hävimise tõttu muutub vars peeneks, taim lamandub ja hävib.

Tõusmepõletiku teket soodustab külm ja märg muld, ebahühtlane kastmine ning suur öise ja päevase temperatuuri vahe. Jälgige, et külvikast ei asuks otse külmal aknalauale ega puutuks vastu külma klaasi. Andke aknalauale sirgivatele taimihakatistele võimalikult palju valgust ja mõõdukalt sooja (optimaalselt 15–18°, temperatuur ei tohiks langeda alla 10–12°). Vajadusel katke taimed ööseks kinni.

6. Kastke veega, mis on taimi ümbritsevast ruumist paar-kolm kraadi soojem. Muld peab olema hühtlaselt



niiske. Kui see kuivab ebahühtlaselt läbi, muutuvad taimed nõrgaks.

7. Kuna mulla pindmine kiht kuivab kõige kiiremini, katke see pestud peene liiva või vermikuliidiga või niisutage pihustiga.

8. Kui lumi on lõpuks sulanud, ei maksa väljas peenrale külvamisega kiirustada. Laske mullal taheneda ja päikesel seda soojendada. Ööseks

pange peenardele sooja hoidmiseks peale mitmekordne katteloor.

9. Külvisubstraadi desinfitseerimiseks, tõusme-, juure- ja varremädanike tõrjeks ning ebajahukaste vastu aitavad hästi seenhaiguste tõrje preparaadid Previcur®607 SL ja Aliette 80 WG.

**ENELI KÄGER**

## TASUB TEADA

### Kui kaua idaneb?

	Idanemisvõime aastates	Tõusmete ilmumise aeg päevades
Aedhernes	5–6	2–3
Aedsalat	2–3	3–5
Aedspinat	3–4	8–14
Aedtill	2–3	14–20
Aeduba	3–4	6–8
Kaalikas	4–5	4–6
Suvikõrvits	4–5	4–8
Kurk	6–8	3–5
Kapsad (pea-, leht-, lill-)	4–5	3–4
Paprika	3–4	7–9
Petersell	2–3	14–20
Porgand	2–4	12–18
Porrulauk	2–4	10–15
Punapeet	4–5	8–12
Põlduba	7–10	10–20
Redis	3–4	3–5
Seller	2–3	14–20
Tomat	7–10	5–6