

## Rõõmsat aastavahetust!

On hommik. Naudin kohvitas- si taga hingematvat vaadet üle valge maastiku. Järsku lendab rõdu metallpiirdele tilluke kollase kõhuga sinitihane ja vaatab mulle tükk aega vägagi etteheitvalt otsa. Korraga tunnen end hirmus halvasti. Piinlik on. Minul siin on soe ja turvaline, kõht on täis. Aga tema, vaeseke, peab kükitama külma tuisu käes, toidulaud – põõsad ja puhmad, kust kõhtu mõne seemne saaks – on mattunud paksu lume alla.


Samal päeval riputan rõduäärise külge poest toodud priske võrgutäie pisikesi mõngleid meenutavaid teravilja-rasvapalikesi. Üks hiljutine Targu Talita ju kirjutas, et need olevat väikeste talvituvate värvuliste jaoks tõeline maiuspala.

Lähem vaatan ka aia üle. Kasvuhoonelt sai just lumi maha aetud, mujal on paks kohev valge tekk aga just hea, ei lase pakasel taimedele liiga teha.

Nüüd on süda rahul, kõige eest on hoolitsetud. Võib hakata pidu pidama ja vana aasta väärikalt ära saata. Mingu ja võtku endaga kaasa kõik halvad asjad.

Pilvede vahele on tekkinud lapike sinist taevast. Päike paneb lume helendama ja teatab rõõmsa sõnumi, et raskem aeg, pimedad aastalõpukuud, on taas seljataga. Valguse jõud on vägev.

Targu Talita toimetust soovib teile kõigile mõnusat vana aasta lõppu. Jätkame uue jõuga!



**KAJA KURG**

### LUGEJA KÜSIB

## Kahjustatud kaktused

**Kaks minu täiesti elujõulist kaktust muutusid tuhmiks ja nende varre alumine osa pehmenes. Mis häda on neile kallale tulnud?**

Vastab

**VÄINO PALLUM**

**T**aime tuhmjas välisilme ja juurekaela pehmenemine on kaktuste puhul mitme kahjustuse esmatunnuseks. Eelmisel korral kirjeldasin neid ja nende tekitajaid, nüüd jätkan tõrjega.

### Kahjustuste ennetamine ja tõrje

Kõigepealt tagage kaktustele kuiv valguseküllane ja talvekuudeks jahe kasvuruum. Kastke tagasihoidlikult, vältige üleväetamist ning vigastuste tekitamist ümberistutamisel. Kui märkate häireid, eemaldage nakkuskahtlased ja haiged kaktused tervetest.

Istutamisel kasutage haigus- ja kahjurivaba kasvumulda, uusi või desinfitseeritud istutuspotte. Potte võib de-

fütotooroosi korral kastke taime Aliette 80 WGga (0,5–1 g/l) ja korra- ke kastmist 3–4 nädala pärast.

Nõrgema toimega vahend on Precicur 607 SL (1–1,5 ml/l).

Kui tahate istutada kaktusepistikuid või fütotooroosikahtlaste juurtega taimi, hoidke neid enne seda 5 minutit Aliette või Previcuri lahuses.

Mädanikust tabandunud taimel löigake desinfitseeritud noaga pealmine osa terve koeni (ilma pruunikate täpideta löikekohas) maha. Löikekohta puuderdate enne kaktuse juurdumapanekut väävliga.

Kaktuse-pehmemädaniku tõrjeks pritsige kaktuse juurekaela Aliettega või Topas 100ECga (0,5 ml/l).

Juuretäide märkamisel kastke kaktust Actara 25 WGga (0,1–0,2 g/l), aga enne seda kastke taimi veega, et turgor oleks kõrge.

Hea tõrjevahend on ka Condifor WG 70 (0,3 g/l) kastmiseks tavalisel mullaniiskusel.

Juuretäide vähesel arvukusel piisab kaktusepoti veega läbipesemisest, täidega asustatud juurte äralõikamisest ja istutamisest uude mulda.

Algava nematoodide kahjustuse korral löigake kahjustatud juured ära ja pange kaktus puhtasse mulda uuesti juurduma.

sinfitseerida keeva veega.

Muld peab olema kerge löimisega, õhku ja vett hästi läbi laskma. Hea, kui segaksite mulda peenestatud puusütt. Tehke seda enne istutamist. Pärast istutamist katke mullapind pestud liiva või puusöepulbriga.

Fusarioosi tõrjeks kastke kaktust Switch 62,5 WGga (1,5–2 g/l).



SVEN ARBET

Kui aga tegu on tugeva kahjustusega, siis hävitage taim.

Nematoodide peletamiseks ja kahjustuse ennetamiseks leotage juuri enne istutamist maarjasõnajala vesileotises (50 g peenestatud sõnajalavarsi ühe l veega kohta).